

LEDEN

ne 1
po 2
út 3
st 4
čt 5
pá 6
so 7
ne 8
po 9
út 10
st 11
čt 12
pá 13
so 14
ne 15
po 16
út 17
st 18
čt 19
pá 20
so 21
ne 22
po 23
út 24
st 25
čt 26
pá 27
so 28
ne 29
po 30
út 31



ÚNOR

st 1
čt 2
pá 3
so 4
ne 5
po 6
út 7
st 8
čt 9
pá 10
so 11
ne 12
po 13
út 14
st 15
čt 16
pá 17
so 18
ne 19
po 20
út 21
st 22
čt 23
pá 24
so 25
ne 26
po 27
út 28

Metamfetamin (pervitin) patří do skupiny stimulačních návykových látek. Jedná se o skupinu psychoanaleptik, které mají stimulační účinek na centrální nervový systém. Projevy intoxikace a akutního účinku jsou stimulace, rozšíření očních zornic, zvýšený krevní tlak, zvýšená výkonnost a zvýšené sebevědomí, ale také snížená soudnost, trysk myšlenek na úkor přesnosti a zapamatování. Intoxikace se může projevit také podrážděností, psychickou labilitou agresivitou či anorexií. Při předávkování se objevuje neklid, neschopnost koncentrace, halucinace, svalové křeče a kardiovaskulární poruchy. Chronický abúzus vede ke ztrátě tělesné hmotnosti, k depresím a psychickým stavům. Vyvíjí se psychická závislost a tolerance na drogu. V pervitinu se objevují nebezpečné nečistoty z výroby, zejména zbytky jodu a rtuťnaté sole. *Fotografie: metamfetamin, Kriministický ústav Praha.*