

U dítěte se najdou pomůcky k braní drog (např. opálené lížicky, malé sáčky, krabičky od léků, papírová psaníčka, injekční stříkačky, jehly apod. Dítě vám může tvrdit, že to není jeho, ale kamaráda, který si to u něj schoval – takové tvrzení není příliš pravděpodobné).

Z dítěte se stává odborník na drogy (dítě vám racionalně vysvětluje důvody pro braní drog, a zejména u marihuany poukazuje na léčivé účinky. Nepřiměřeně se věnuje studiu tematizované literatury).

Další příznaky (dále se může jednat o náhlé vzniklé spaní přes den, nespavost v noci spojenou s podivným kutěním v pokoji, nechutenství, hubnutí, zanedbávání péče o zevnějšek, kožní defekty (stopy po škrábání a drobná sebepoškození, zejména na obličeji a hřebetech rukou), zvyšující se nespolehlivost, postupná ztráta kvalitních zájmů, tajnouškářství).

Varovná znamení

- Náhlá změna nálad, netypické reakce na situace
- Změna přátel a známých
- Skrývání a zakrývání
- Lží a předstírání
- Překvapivě rychle nastupující sexuální aktivity
- Chybějící léky či alkohol v domácnosti
- Zhoršování ve škole
- Výrazná změna v oblečení a stylu hudby
- Častá vyčerpanost, únava a spavost
- Izolace od rodiny
- Snížené sebevědomí
- Ztrácející se věci a peníze

Ještě jednou zdůrazňujeme, nic z toho nemusí dokazovat užívání drog. Pokud se ovšem takové známky vyskytují společně nebo opakovaně, vždy se vyplatí reagovat.

Ve slovníku vašich dětí nebo blízkých se začínají objevovat např. slangová pojmenování pro jednotlivé druhy drog:

- Marihuana a hašiš – tráva, joint, marijánka, mařka, brko, špek, hulení, model, haš
- Pervitin – perník, piko, peří, péčko, pardubice
- Extáze – éčko, extoška, extasy, tableta
- Halucinogeny (LSD, lysohlávky) – LSD-trip, kyselina, papírek, acid
- Lysohlávky – houbky, houbičky
- Heroin – hero, háčko, herák, ejč
- Tlumivé látky (např. diazepam, Neurol, Lexaurin, Rohypnol) - benzáky, diák, lexáč, rivál, roháč
- Těkavé látky - téčko

Když je vaše dítě „sjeté“ doma - první pomoc

Pokud máte důvodné podezření, že je dítě pod vlivem drogy, podle možností zjistěte, jakou drogu a v jakém množství užilo. Jestliže vám to dítě neřekne, protože nechce nebo nemůže, potom vám nebo lékaři mohou pomoci obaly od léků, psaníčka, prázdné ampulky, zbytky drogy nebo různé pomůcky braní drog. Když se dítě chová nepřiměřeně a hrozí, že by mohlo ublížit sobě nebo někomu druhému, odvezte dítě k lékaři nebo lékaře zavolejte k vám domů.

V případě výrazné agrese nebo sebepoškozování dítěte nevahejte volat policii. Zavolejte lékaře i tehdy, pokud se dítě nedá probudit, nereaguje na žádné podněty, došlo u něj k úrazu hlavy nebo k jiné zdravotní komplikaci – v tomto případě dítě uložte do polohy na boku, aby mu nezypadl jazyk, tj. tzv. stabilizovaná poloha. V průběhu noci se opakováním přesvědčujte o jeho stavu. Lékaře rovněž zavolejte v situaci, kdy u dítěte přetrávájí duševní problémy, jako jsou např. halucinace nebo pocity pronásledování, a to i po odezniční účinku drogy.

Než přijde lékař, vy zjistíte, že:

Dítě je při vědomí a k otravě došlo ústy:

Je třeba podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím). Pak vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení. Ošetřete případná zranění a zajistěte neustálý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita, a předejte je přivolánému lékaři. Usnadněte tím další léčbu